

DIAGNÓSTICO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA



3/5 %

Entre el **3** y el **5 %** de los **afectados de esclerosis múltiple** comienzan a manifestar **síntomas antes de los 16 años**^{1,2}



98 %

El **98 % de los niños y los adolescentes** con esclerosis múltiple presentan la **forma remitente-recurrente (EMRR)**²



53 %



17 %

Los **brotes severos son más frecuentes en los niños** que en los adultos (**53% vs 17%**)

Un diagnóstico difícil



Existen **diferentes trastornos** en la infancia con **síntomas parecidos** a la EM



El **retraso en diagnóstico y tratamiento precoz es clave** en la etapa **infantil** para evitar una **mayor discapacidad** en la **etapa adulta**



Hasta **2/3 de pacientes** pueden tener **síntomas de EM** en la **edad pediátrica** y **no ser diagnosticados** hasta la **edad adulta**³



Referencias: **1.** Kids get MS too: A guide for parents with a child or teen with MS. Multiple Sclerosis Society of Canada and National MS Society. 2011 / **2.** Alroughani y Boyko A. Pediatric multiple sclerosis: a review. BMC Neurol. 2018;18:27 / **3.** Chitnis T, Gianz B, Jaffin S, et al. Mult Scler. 2009;15(5):627-631